

VALITSE OIKEA KORVATUOTE POTILAALLESISI

Käyttötarkoitus/ominaisuus

Tuote	Säännöllinen korvien puhdistus	Vahaa liuottava	Hiivan liuottava	Grampositiivisten bakteerien liikakasvu +/- hiiva	Gramnegatiivisten bakteerien liikakasvu +/- hiiva	pH	Vaikuttavat aineet
CleanAural koirille	•	•	•	•		Neutraali	Propyleeniglykoli, isopropyylialkoholi
CleanAural Sensitive koirille	•	•	•	•		Neutraali	Glyseriini, kamomilla, Yucca-uute
CleanAural kissoille	•	•	•	•		Neutraali	Glyseriini, propyleeniglykoli, klorotymoli
CerumAural		•				Neutraali	Skvalaani
MalAcetic Aural		•	•	•		Hapan	2 % etikkahappo, 0,2 % boorihappo
TrizAural					•	Emäksinen	Triz-EDTA
TrizChlor			•	•	•	Emäksinen	0,15 % klorheksidiiniglukonaattia, Triz-EDTA
Canaural® vet			•	•	•	Neutraali	Fusidiinihappo, framysetiini, nystatiini, prednisoloni
DuOtic®			•	•	•		Beetametasoni, terbinafiini
Osumnia®			•	•	•		Beetametasoni, florfenikoli, terbinafiini
Recicort® vet		•			•	Hapan	Salisyylihappo, triamsinoloni

Canaural vet. korvatipat, suspensio koirille ja kissoille. **Vaikuttavat aineet:** Dietanoliamiinifusidaatti 5,0 mg Framysetiinisulfaatti 5,0 mg, Nystyatiini 100 000 IU, Prednisoloni 2,5 mg. **ATCvet-koodi:** QS02CA01. **Kohde-eläinlaji(t):** Koiria ja kissa. **Käyttöaiheet:** Otitis externa. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys valmisteesä oleville aineille. Älä käytä tätä valmistetta, jos eläimen korvan tärykalvo on rikkoutunut. **Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain:** Ei ole. Eläimiä koskevat erityiset varoitimet. Vain ulkoiseen käyttöön. Anti-inflammatoriset kortikosteroidit, kuten prednisoloni, voivat aiheuttaa monia erilaisia haittavaikutuksia. Tämän vuoksi keskipitkässä ja pitkäaikaisessa hoidossa on yleensä käytettävä mahdollisimman pientä annosta. **Erityiset varoitenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:** Kädet pestävä käytön jälkeen. Jos valmistetta joutuu vahingossa silmään, huuhtele heti runsaalla vesimäärällä. Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä valmisteeseen sisältämälle vaikuttavalle aineelle tai apuaineelle, pitää välttää kosketusta eläinlääkevalmisteeseen kanssa. **Haittavaikutukset:** Valmisteeseen sisältämät aineosat saattavat aiheuttaa allergiaa tai yliherkkyyttä. Hyvin harvinaisena haittavaikutuksena (<1/10 000) on raportoitu kuulon heikkenemistä valmisteeseen käytön jälkeen. **Käyttö tiineyden ja laktation aikana:** Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta tiineyden ja laktation aikana ei ole selvitetty. **Yhteisvaikutukset:** Ei tunnettu. **Annostus ja antotapa:** 5–10 tippaa tulehtuneeseen korvakäytävään puhdistuksen jälkeen kahdesti päivässä 1–4 viikon ajan tulehduksen vaikeusasteesta riippuen. Valmistetta ei tule käyttää märkään korvakäytävään. Korvahuuhtelun jälkeen tulee odottaa korvien kuivumista ennen valmisteeseen käyttöä. Ravistettava ennen käyttöä. Poista korvavaha ja lika korvakäytävästä varovasti puhtaalla puuvillapallulla tai vastaavalla ennen lääkkeen antoa, varoen ihon rikkoutumista. Tipponen annostelun jälkeen korvan kevyt hierominen parantaa tipponen levittämistä korvakäytävään. **Varoika:** Ei oleellinen. **MYNTILUVAN HALTIJA:** Dechra Veterinary Products A/S. **Paikallinen edustaja:** Dechra Veterinary Products Oy. **Pakkaukset ja hinnat (tmh) 03.2025:** 25 ml 20,00 €. **Reseptilääke. SPC:n muuttamispäivä:** 6.3.2011. **Yliä oleva teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja:** [Pharmaca Fennica Oy](http://www.dechra.fi) tai www.dechra.fi.

DuOtic 10 mg / 1 mg korvageeli koiralle. **Vaikuttava aine:** Terbinafiini 10 mg, beetametasoniasetaatti 1 mg **ATCvet-koodi:** QS02CA90 **Kohde-eläinlaji:** Koiria **Käyttöaiheet:** *Malassezia pachydermatis* -hiivasieneen liittyvän ulkokorvatulehduksen hoito. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää yliherkkydessä vaikuttaville aineille, muille kortikosteroideille tai apuaineille, eikä jos tärykalvo on puhjennut tai koiralla on yleistynyt demodikoosi. **Erityisvaroitukset:** Puhdista korvat ennen ensimmäistä hoitokertaa keittosuolaliuoksella, kuten kliinisissä tutkimuksissa, joissa korvat puhdistettiin vain kerran ennen ensimmäistä antokertaa (45 pv tutkimus). Jos hoito lopetetaan, korvakäytävät on puhdistettava ennen toisen valmisteeseen aloittamista. Lääkkeen jälkeen korvalla voi esiintyä ohimenevää märkyyttä, mutta tämä ei ole kliininen huolenaihe. Sienen aiheuttama korvatulehdus on usein sekundaarinen ja taustasyynä tulee diagnosoida ja hoitaa. Lääkkeen teho voi vaihdella, jos eläimellä on aiemmin ollut krooninen tai toistuva ulkokorvatulehdus ilman taustasyiden hoitoa. **Eläimiä koskevat erityiset varoitimet:** Turvallisuutta ei ole selvitetty alle 2 kk:den ikäisillä tai alle 1,4 kg:n koirilla. Käytön tulee perustua kohdepatogeenin tunnistamiseen ja herkkyysmäärityksen tai epidemiologian tietoon. Lääkkeen käytössä on noudatettava kansallisia/alueellisia ohjeita mikrobilääkkeiden käytöstä. Käyttö valmisteyhteenvedosta poikkeavalla tavalla saattaa lisätä terbinafiinille resistenttien sienien yleisyyttä ja vähentää muiden sienilääkehoidon tehoa. Loisten tai bakteerien aiheuttamassa ulkokorvatulehduksessa on annettava tarvittavaa akarisidi- tai antibioottihoitoa. Ennen lääkkeen antamista on tarkistettava, ettei tärykalvo ole puhjennut, ettei tärykalvo ole puhjennut. Pitkäaikainen kortikosteroidien käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia, kuten lisämunaaisilmaa. Stedettyävyyttutkimuksissa havaittiin pienentyneitä kortisolipitoisuuksia käytettäessä lähisukuista valmistetta, mikä viittaa beetametasonin imeytymiseen. Löydös ei ollut yhteydessä patologiisiin/kliinisiin oireisiin ja se oli palautuva. Samanaikaista käyttöä muiden kortikosteroidien kanssa pitää välttää. Lääkettä on käytettävä varoen koirille, joilla on umpierityssairauksia, kuten diabetes tai kilpirauhasen toimintahäiriöitä. Lääke voi aiheuttaa silmien ärsytystä. Vältä sen joutumista koiran silmiin, ja huuhtele silmät huolellisesti vedellä 10–15 minuuttia, jos näin käy. Hyvin harvinaisissa tapauksissa lähisukuisella valmisteella on raportoitu silmäsairauksia, kuten kuivausilmäisyttä ja sarveiskalvon haavaumia, ilman silmäkosketusta valmisteeseen. Syyshuudetta ei ole osoitettu pitäväksi, mutta tarkalle silmäoireita lääkkeen antamista seuraavina tunteina ja päivinä. Lääkkeen turvallisuutta ja tehoa kissoilla ei ole arvioitu. Seuranta lähisukuisella valmisteella on osoittanut, että lääkkeen käyttö voi aiheuttaa neurologisia (esim. Hornerin oireyhtymä, ataksia) ja systeemisiä oireita (ruokahaluttomuus, letargia) kissoilla, joten käyttöä kissoille on vältettävä. **Erityiset varoitenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:** Voi aiheuttaa silmien ärsytystä, erityisesti jos koiria ravistaa päätään lääkettä annettaessa. Riskin minimoimiseksi lääke tulisi antaa vain eläinlääkärin toimesta tai valvonnassa. Estä silmiin joutuminen suojaomilla (esim. suojalasit, korvakäytävän hierominen lääkkeen jakautumisen varmistamiseksi ja koiran välttämisen lääkkeenannon jälkeen). Vältä kädestä-silmään kontaktia. Jos valmistetta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti vedellä 10–15 min. Oireiden kehityessä, ota yhteyttä lääkäriin, näytä pakkauseloste. Jos valmistetta joutuu iholle, pese iho huolellisesti. Jos nielet vahingossa valmistetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, näytä pakkauseloste. **Haittavaikutukset:** Melko harvinainen: Kohonneet maksaentsyymiarvot. Hyvin harvinainen: Kuurous, huonokuuloisuus, antokohdan reaktiot (punoitus, kipu, kutina, turvotus, haavauma), yliherkkyysreaktiot (mm. kasvoturvotus, urtikaria sokki) **Käyttö tiineyden ja laktation aikana:** Beetametasonilla tiedetään olevan epämuodostumia aiheuttavia vaikutuksia laboratoriotutkimuksissa käytettävillä eläinlajeilla. Turvallisuutta tiineyden, laktation tai siitoseläimillä ei ole tutkittu, joten sitä ei saa käyttää näissä tilanteissa. **Yhteisvaikutukset:** Yhteensopivuutta muiden korvanpuhdistusaineiden kuin keittosuolaliuoksen kanssa ei ole osoitettu. **Annostus ja antotapa:** Anna yksi tuubi hoidettavalle korvaa kohti. Toista lääkkeenantoa 7 pv:n kuluttua. On mahdollista, että kliininen enimmäisvaste saavutetaan vasta 21 pv:n kuluttua toisesta antokerrasta (28 pv:n kuluttua hoidon aloittamisesta). Ulkoinen korvakäytävä on suositeltavaa puhdistaa ja kuivata ennen lääkkeen ensimmäistä antokertaa. Lääkkeen antamisen jälkeen korvan tyveä voi hieroa lyhyesti ja varovasti, jotta lääke jakautuu tasaisesti korvakäytävään. **Myyntiluvan haltija:** Dechra Regulatory B.V. **Paikallinen edustaja:** Dechra Veterinary Products Oy. **Pakkaukset ja hinnat (tmh) 06.2025:** 20 tuubia 188,60 €. **Reseptilääke. Tekstin muuttamispäivä:** 22/11/2024 **Yliä oleva teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja:** [Pharmaca Fennica Oy](http://www.dechra.fi) tai www.dechra.fi.

Osurnia korvageeli koirille. **Vaikuttavat aineet:** Yksi annos (1,2 g) terbinafiini, 10 mg, florfenikoli 10 mg, beetametasoniasetaatti 1 mg. **ATCvet-koodi:** QS02CA90. **Kohde-eläinlaji:** Koiria. **Käyttöaiheet:** Akuutin ulkokorvatulehduksen ja akuutisti pahentuneen toistuvan ulkokorvatulehduksen hoito, kun aiheuttajina ovat *Staphylococcus pseudintermedius* ja *Malassezia pachydermatis*. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää, jos tärykalvo on puhjennut tai koirille, joilla on yleistynyt demodikoosi. **Erityisvaroitukset:** Puhdista korvat ennen ensimmäistä hoitokertaa. Korvat saa puhdistaa uudelleen aikaisintaan 21 vrk:ta toisen hoitokerran jälkeen. Valmisteeseen teho saattaa muuttua eläimillä, joilla on aiemmin ollut krooninen tai toistuva ulkokorvatulehdus, mikäli ei huomioida sairauden taustalla olevia syitä, kuten allergiaa tai korvan anatomista muotoa. **Eläimiä koskevat erityiset varoitimet:** Valmisteeseen turvallisuutta alle 2 kk:den ikäisten tai alle 1,4 kg:n painoisten koirien hoidossa ei ole selvitetty. Käytön on perustuttava infektiota aiheuttavien organismien tunnistamiseen ja herkkyysmäärityksen mahdollisuuksien mukaan. Kortikosteroideja sisältävien paikallishoitovalmisteiden pitkäaikaisen ja intensiivisen käytön on todettu aiheuttavan systeemisiä vaikutuksia, esim. heikentävän lisämunaisten toimintaa. Voi ärsyttää silmiä. Turvallisuutta ja tehoa kissoille ei ole arvioitu. Omistajia tulee kehottaa tarkkailemaan silmäoireita (sieristys, punoitus, silmäerite) valmisteeseen annon jälkeen ja ottamaan viipymättä yhteyttä eläinlääkäriin oireiden ilmetessä. **Erityiset varoitenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:** Valmistetta voi vahingossa joutua silmiin, jos koiria ravistelee päätään valmistetta annettaessa tai heti sen jälkeen. Jos valmistetta vahingossa joutuu iholle, pese alue runsaalla vedellä. **Haittavaikutukset:** Myyntiluvan myöntämisen jälkeen on ilmoitettu hyvin harvinaisissa tapauksissa, joissa valmisteeseen käytön jälkeen pääasiassa ikääntyneillä eläimillä on ilmennyt kuuroutta tai kuolon heikkenemistä, joka on tavallisesti ollut väliaikaista. Hyvin harvinaisissa tapauksissa hoidetuilla koirilla on raportoitu silmäsairauksia (esim. keratoconjunctiviitis sicca, sarveiskalvon haavauma, blefarospasmi) sekä erittäin harvinaisissa tapauksissa neurologisia oireita, kuten ataksiaa, pään kallistusta, facialisparalyysiä ja nystagmista. **Käyttö tiineyden, imetyksen tai muninnan aikana:** Ei saa käyttää tiineyden ja imetyksen aikana. **Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:** Yhteensopivuutta muiden korvanpuhdistusvalmisteiden, paitsi suolaliuoksen, kanssa ei ole osoitettu. **Annostus ja antotapa:** Korvaan. Suositellaan, että ulkokorvakäytävä puhdistetaan ja kuivataan ennen ensimmäistä käyttökertaa. Suositellaan, että korvat puhdistetaan uudestaan aikaisintaan 21 vrk:ta toisen käyttökerran jälkeen. Annosteleyden tuubin sisältö kuhunkin tulehtuneeseen korvaan. Maksimaalinen hoitovaste saavutetaan mahdollisesti vasta 21 vrk:n kuluttua toisesta hoitokerrasta. **Varoika:** Ei oleellinen. **Myyntiluvan haltija:** Dechra Regulatory B.V. **Paikallinen edustaja:** Dechra Veterinary Products Oy. **Pakkaukset ja hinnat (tmh) 03.2025:** 2x1ml 18,88€, 20x1ml 188,60€. **Reseptilääke. Tekstin muuttamispäivä:** 12.5.2025. Tämän eläinlääkevalmisteen koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoitteessa <http://www.ema.europa.eu/>. **Yliä oleva teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja:** [Pharmaca Fennica Oy](http://www.dechra.fi) tai www.dechra.fi.

Recicort vet 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml korvatipat, liuos koiralle ja kissalle. **Vaikuttavat aineet:** Triamsinoloniaasetonidi ja salisyylilihapo. **Kohde-eläinlaji(t):** Koiria ja kissa. **ATCvet-koodi:** QD07XB02. **Käyttöaiheet:** Ulkokorvatulehdus. Korvavalehdin talin vuotoon liittyvän ihotulehduksen (seborrooisen dermatiitin) oireenmukainen hoito. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää yliherkkyyden (kortikosteroidit, salisyylilihapo, apuaineet), puhjenneen tärykalvon (ototoksinen riski) tai demodikoosin yhteydessä. **Erityisvaroitukset:** Jotta ulkokorvatulehduksen hoito olisi tehokasta, korvakäytävä on puhdistettava huolellisesti korvavahan ja/tai eksudaatin poistamiseksi ja kuivattava ennen hoidon aloittamista. Tarvittaessa liialliset karvat voi leikata. Talivuotoihottuman hoidossa on aluksi poistettava ennestään oleva hilse tai hilseilevä iho. Leseoidien päältä tai ympäriltä voi tarvittaessa leikata karvat, jotta lääkevalmiste saadaan iholle asti. Ulkokorvatulehdus ja talivuotoihottuma voivat olla primaarisia sairauksia tai seurata taustasairauksista (esim. allergiat, umpierityshäiriöt, neoplasia). Niiden yhteydessä esiintyy usein samanaikaisia infektiota (bakteeri-, loisi- tai sieniperäisiä), jotka voivat myös komplisoida tilannetta. Tästä syystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset taustasairaudet ja aloittaa niiden hoito tarvittaessa. **Eläimiä koskevat erityiset varoitimet:** Enimmäisannos on 7 tippaa/painokilo/vuorokausi. Suositeltu annos (8–10 tippaa/korva kerran tai kahdesti vuorokaudessa) ei saa ylittää tätä määrää. Annoksen ylittämistä on erityisesti vältettävä hoidettaessa pienikokoisia eläimiä tai molempia korvia. Ulkokorvatulehduksessa, johon liittyy infektiota (bakteeri-, loisi- tai sieniperäinen), tarvittaessa annetaan sopivaa hoitoa. Systemiset kortikosteroidivaikutukset ovat mahdollisia, erityisesti jos eläin nuolee valmistetta ja sitä kulkeutuu ruoansulatuskanavaan. Valmisteeseen pääsyä eläimen tai muiden suuhun, esimerkiksi nuolemalla, tulee välttää. Lisäkortikosteroideja voidaan antaa vain hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haaitta-arvioinnin perusteella. Valmistetta on käytettävä varoen eläimillä, joilla epäillään tai tiedetään olevan umpierityssairaus (esim. diabetes, kilpirauhasen toimintahäiriö, lisämunaaiskuoren liikatointiminta). Koska glukokortikosteroidit voivat hidastaa kasvua, alle 7 kuukauden ikäisillä niiden käyttö perustuu hoitavan eläinlääkärin arviointiin ja säännöllisiin klinisiin tarkastuksiin. Valmisteeseen joutumista silmiin tulee välttää, eikä sitä saa käyttää vaurioituneelle iholle. Jos esiintyy yliherkkyttä, korva on pestävä huolellisesti. **Erityiset varoitenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:** Sisältää triamsinoloniaasetonidia, salisyylilihapoa ja etanolia, ja voi olla haitallinen lapsille, jos sitä niellään vahingossa. Älä jätä valmistetta valvomatta, jos nielet valmistetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja näytä pakkauseloste. Voi ärsyttää ihoa tai aiheuttaa yliherkkyysreaktioita. Kortikosteroideille tai salisyylilihapolle yliherkkien tulee välttää kosketusta valmisteeseen kanssa. Käytä kertakäyttöisiä, läpäsämetömiä käsitteillä valmistettua, myös hierottamista eläimen hoidettaessa aluetta. Jos iho altistuu, pese kädet ja altistunut alue. Ota yhteyttä lääkäriin, jos ilmenee yliherkkyttä tai ärsytystä jatkuen. Voi ärsyttää silmiä. Vältä silmäkosketusta, myös käsin kautta. Jos valmistetta joutuu silmiin, huuhtele vedellä. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin ja näytä pakkauseloste. Voi olla haitallinen syntymättömälle lapselle. Koska se voi imeytyä ihon läpi, raskaana olevat ja raskautta suunnittelevat naiset eivät saa käsitellä valmistetta tai pidellä eläintä hoidon aikana. Kontaktia hoidettavan eläimen korviin on vältettävä vähintään 4 tunnin ajan lääkkeen käytön jälkeen. Hoidettuja eläimiä ei pidä käsitellä ennen kuin lääke on kuivunut, eikä lasten tulisi leikkiä hoidettujen eläinten kanssa. Suositellaan, ettei hoidettujen eläinten anneta nukkua omistajien kanssa, erityisesti lasten kanssa. **Haittavaikutukset:** Topikaalisten kortikosteroidien pitkäaikainen ja laajamittainen käyttö tiedetään laukaisevan paikallisia ja systeemisiä vaikutuksia, joita ovat mm. lisämunaaiskuoren toiminnan suppeneminen, epidermiksen oheneminen ja viivästynyt paraneminen. Harvoissa tapauksissa on raportoitu punoitusta ja ihon hilseilyä. **Käyttö tiineyden ja laktation aikana:** Turvallisuutta tiineyden/laktation aikana ei ole varmistettu. Käyttö perustuu vain hoitavan eläinlääkärin tekemään hyöty-haaitta-arviointiin. **Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset:** Tietoja ei ole saatavana. Lisäkortikosteroideja saa antaa vain hoidosta vastaavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haaitta-arvioinnin mukaisesti. **Annostus ja antotapa:** Korvaan. Korvakäytävä: Puhdista ulkoinen korvakäytävä ja korvalehti. Tiputa 8–10 tippaa hoidettavaan ulkoiseen korvakäytävään kerran tai kahdesti päivässä. Hiero hellävaraisesti varmistaksesi, että valmiste leviiä kunnolla. Päivittäinen hoidosannos ei saa ylittää 7 tippaa/painokilo. Ole erityisen varovainen pienikokoisten eläinten tai molempien korvien hoidossa. Hoitoa jatketaan oireiden häviämiseen asti ja vielä muutama päivä sen jälkeen, mutta enintään 14 vrk. Jos oireet eivät parane 3 päivän jälkeen, arvioi hoito uudelleen. Korvalehti: Talivuotoihottuman hoidossa tiputa riittävä määrä valmistetta kahdesti päivässä korvavalehdin pinnalle niin, että se kattaa hoidettavan alueen. Hiero aluetta hellävaraisesti tarvittaessa ja anna kuivua. Vaikeissa tapauksissa voit levittää toisen ja kolmannen kerroksen, kun edellinen kerros on kuivunut, kunhan tipponen kokonaisuudessaan ei ylitä 7 tippaa/painokilo/vrk. Ole varovainen pienikokoisten koirien ja kissojen hoidossa. Jatka hoitoa oireiden häviämiseen asti ja vielä muutama päivä sen jälkeen, mutta enintään 14 vrk. **Varoika:** Ei oleellinen. **Myyntiluvan haltija:** Le Vet Beheer B.V. **Paikallinen edustaja:** Dechra Veterinary Products Oy. **Pakkaukset ja hinnat (tmh) 03.2025:** Pipettipullo 20ml, 11,15 €. **Reseptilääke.** Tekstin muuttamisvpm: 24.04.2019. **Yliä oleva teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja:** [Pharmaca Fennica Oy](http://www.dechra.fi) tai www.dechra.fi.