

Soveltuu seuraaville potilaille

- Potilas saa Vetoryl-hoitoa kerran tai kaksi kertaa päivässä.
- Potilaalla on lisämunuais- tai aivolisäkeperäinen hyperadrenokortisismi.
- Kliinisesti hyvävointiset koirat (joilla on tai ei ole hyperadrenokortisismioireita).
- Rauhalliset koirat.

Ei sovellu seuraaville potilaille

- Aggressiiviset koirat.
- Stressaantuneet koirat (joilla levottomuus on kestänyt kauemmin kuin vain noin tunnin).
- Kliinisesti huonovointiset koirat.


VETORYL[®]
Life restored on every level

Mitä parempaa tiimityötä, sitä parempia tuloksia

Eläinlääkärin ja koiranomistajan yhteistyöllä
kohti parempia hoitotuloksia.

Eläinlääkärikäynti

- Varaa aika näytteenottoon ajankohtaan, jolloin koira yleensä saa Vetoryl-annoksensa.
- Jos kyseinen ajankohta on hankalasti järjestettävissä (esimerkiksi klo 6 aamulla), pyydä omistajaa antamaan kapseli sopivampana ajankohtana tutkimusta edeltävänä päivänä (esimerkiksi klo 9).
- Tarkista omistajalta, ettei koira ole saanut Vetoryl-annosta eikä aamun aikana ole tapahtunut mitään stressaavaa (esimerkiksi ettei koira ole oksentanut tai loukannut itseään).
- Hoidon tehoa arvioitaessa on ehdottoman välttämätöntä keskustella omistajan kanssa koiran kliinisestä vasteesta.

Näytteenotto

- Ota verikoe heti kliinisen tutkimisen jälkeen, ennen Vetoryl-annoksen antamista.
- 1–2 ml plasmaa tai seerumia.
- Näyte voidaan sentrifugoida ja säilyttää viikon ajan.
- Lähetä näyte ulkopuoliseen, laadunvarmistusohjelmaan (ESVE- tai SCE-ohjelma) kuuluvaan laboratorioon, joka mielellään käyttää Siemens IMMULITE®-menetelmää tai vastaavaa validoitua menetelmää.


Vetoryl® kapseli, kova 10 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg koiralle. **Vaikuttava aine:** Trilostaani. **ATCvet-koodi:** QH02CA01. **Kohde-eläinlaji:** Koira. **Käyttöaiheet:** Aivolisäke- ja lisämunuaisperäisen lisämunuaiskuoren liikatoiminnan (Cushingin taudin/oireyhtymän) hoito koiralla. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää koirille, joilla on primaarinen maksasairaus ja/tai munuaisten vajaatoiminta. 10 ja 30 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 3 kg painaville koirille. 60 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 10 kg painaville koirille. 120 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 20 kg painaville koirille. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör undvika att hantera kapslarna. Tvätta händerna med tvål och vatten efter oavsiktlig exponering och efter användning. Kapslarna får inte delas eller öppnas. **Eriytiset varoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:** Trilostaani voi heikentää testosteronituotantoa, ja sillä on anti-progesteronisia ominaisuuksia. Raskaana olevien tai raskaaksi pyrkivien naisten tulee välttää kosketusta kapselien kanssa. **Haittavaikutukset:** Lisämunuaiskuoren vajaatoimintaan liittyviä oireita, kuten heikkoutta, väsymystä, ruokahaluttomuutta, oksentelua ja ripulia voi ilmetä erityisesti silloin kun seuranta on riittämätöntä. Myös akuutti Addisonin kriisi (kollapsi) on mahdollinen. **Yhteisvaikutukset:** Kliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu yhteisvaikutuksia. **Annostus ja antotapa:** Valmiste annetaan suun kautta kerran päivässä ruoan kanssa. Hoidon aloitusannos on noin 2 mg/kg, riippuen saatavilla olevista kapselivahvuuksien yhdistelmästä. Jos oireet eivät pysy riittävästi hallinnassa koko annosten välisen 24 tunnin ajan, harkitse päivittäisen kokonaisannoksen lisäämistä enintään 50 % ja annoksen jakamista samansuuruisiin aamu- ja ilta-annoksiin. Lisätietoja tarkkailusta ja seurannasta saat ottamalla yhteyttä valmistajaan tai lukemalla lisätietoja spc.fimea.fi -osoitteesta. **Myyntiluvan haltija:** Dechra Regulatory B.V. **Pakkaukset ja hinnat (tmh) 09.2020:** 10 mg 30 kaps. 33,17€, 30 mg 30 kaps. 44,67€, 60 mg 30 kaps. 57,13 €, 120 mg 30 kaps. 88,72€. **Reseptilääke. SPC:n muuttamispäivä:** 7.3.2019. **Yllä oleva teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja:** Pharmaca Fennica Oy tai www.dechra.fi.




Dechra
Veterinary Products

Cushingin oireyhtymän seuranta

Kehitetty yhteistyössä seuraavien asiantuntijoiden kanssa: Ian Ramsey BVSc, PhD, DSAM, Dipl. ECVIM-CA, FHEA, MRCVS, Federico Fracassi DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA, Nadja Sieber-Ruckstuhl PhD, Dr. med. vet, Dipl. ACVIM, Dipl. ECVIM-CA



Kaavion/hoitovasteen tulkinta

¹ Polyurian/polydipsian, polyfagian, läähätyksen ja letargian pitää loppua tai parantua kuukauden kuluessa. Alopesian ja vatsan pingottuneisuuden parantuminen/normalisoituminen vie yleensä 3–6 kuukautta.

² Mieti potilaan aiempia sairauksia ja harkitse Pre-Vetoryl-ACTH-stimulaatiota. Ota tarvittaessa yhteyttä Dechran tekniseen tukeen.

³ Jos oireet eivät pysy asianmukaisesti hallinnassa vuorokauden ympäri, harkitse vuorokausiannoksen suurentamista noin 50 % ja sen jakamista kahteen annokseen.

⁴ Käytä kapselin yhdistelmää suurentaaksesi tai pienentääksesi vuorokausiannosta.

⁵ Jatkuva deksametasoni-infuusio tai vaihtoehtoisesti hydrokortisoni hypokortisolismien hoitoon, nesteytys laskimoon elimistön kuivumistilan ja hyperkalemian korjaamiseksi.

Nämä luvut perustuvat Siemens IMMULITE 1000/2000 -laitteiston käyttöön. Muilla analyysilaitteistoilla voi olla muita viitearvoja, hoitavan eläinlääkärin pitää epäselvissä tilanteissa konsultoida laboratoriotaan.