

Haasteiden ratkaisu on yhteispeliä

Kun koira, koiranomistaja ja eläinlääkinnän ammattilaiset tekevät yhteistyötä, Cushingin oireyhtymä jää häviölle.



Lisätietoja: www.dechra.se/vetoryl-monitorering

Vetoryl® kapseli, kova 10 mg, 30 mg, 60 mg, 120 mg koiralle. **Vaikuttava aine:** Trilostaani. **ATCvet-koodi:** QH02CA01. **Kohde-eläinlaji:** Koira. **Käyttöaiheet:** Aivolisäke- ja lisämunuaisperäisen lisämunuaiskuoren liikatoiminnan (Cushingin taudin/oireyhtymän) hoito koiralla. **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää koirille, joilla on primaarinen maksasairaus ja/tai munuaisten vajaatoiminta. 10 ja 30 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 3 kg painaville koirille. 60 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 10 kg painaville koirille. 120 mg kapselit: Ei saa käyttää alle 20 kg painaville koirille. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör undvika att hantera kapslarna. Tvätta händerna med tvål och vatten efter oavsiktlig exponering och efter användning. Kapslarna får inte delas eller öppnas.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: Trilostaani voi heikentää testosteronituotantoa, ja sillä on anti-progesteronisia ominaisuuksia. Raskaana olevien tai raskaaksi pyrkivien naisten tulee välttää kosketusta kapslien kanssa. **Haittavaikutukset:** Lisämunuaiskuoren vajaatoimintaan liittyviä oireita, kuten heikkoutta, väsymystä, ruokahaluttomuutta, oksentelua ja ripulia voi ilmetä erityisesti silloin kun seuranta on riittämätöntä. Myös akuutti Addisonin kriisi (kollapsi) on mahdollinen. **Yhteisvaikutukset:** Kliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu yhteisvaikutuksia. **Annostus ja antotapa:** Valmiste annetaan suun kautta kerran päivässä ruoan kanssa. Hoidon aloitusannos on noin 2 mg/kg, riippuen saatavilla olevista kapselivahuuksien yhdistelmistä. Jos oireet eivät pysy riittävästi hallinnassa koko annosten välisen 24 tunnin ajan, harkitse päivittäisen kokonaisannoksen lisäämistä enintään 50 % ja annoksen jakamista samansuuruisiin aamu- ja iltä-annoksiin. Lisätietoja tarkkailusta ja seurannasta saat ottamalla yhteyttä valmistajaan tai lukemalla lisätietoja spc.fimea.fi -osoitteesta. **Myyntiluvan haltija:** Dechra Regulatory B.V. **Pakkaukset ja hinnat (tmh) 09.2020:** 10 mg 30 kaps. 33,17€, 30 mg 30 kaps. 44,67€, 60 mg 30 kaps. 57,13 €, 120 mg 30 kaps. 88,72€. **Reseptilääke. SPC:n muuttamispäivä:** 7.3.2019. **Yllä oleva teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja:** Pharmacia Fennica Oy tai www.dechra.fi.

Dechra Veterinary Products AB nordic.support@dechra.com
www.dechra.fi ©Dechra Veterinary Products A/S Syyskuu 2020



VETORYL®
Life restored on every level

Cushingin oireyhtymä – kliinisten oireiden arviointi

Onko koirassa havaittavissa merkkejä siitä, ettei se voi hyvin?

Onko koirassa havaittavissa huonossa hoitotasapainossa olevan sairauden merkkejä?

Jano/virtsautuminen



Ulkonäkö



Ruokahalu




Aktiivisuustaso



Elämänlaadun arviointi (QoL)

Arvioi tilanne yksilöllisesti sekä koiran että koiranomistajan kannalta.

Käytä tieteellisesti validoitua työkalua, CushQoL-pet-lomaketta, helpottaaksesi vuorovaikutusta koiranomistajan kanssa.



Kliininen tutkiminen

Kliininen tutkimustilanne on hyvä hetki havainnoida huonoon vointiin ja/tai samanaikaisiin sairauksiin viittaavia oireita.

Näin saat myös käsityksen siitä, onko koiranomistajan selostus yhtenevä oman kliinisen arviosi kanssa.

Kortisolimittaus



Potilas ei voi hyvin (oksentelua, ripulia, ruokahaluttomuutta).

ACTH-stimulaatiotesti



Potilaalla on Cushingin oireyhtymän oireita.

Pre-Vetoryl-kortisolimittaus



Potilas voi hyvin

Pre-Vetoryl-kortisolimittaus

Koska Pre-Vetoryl-kortisolimittausta ei mainita Vetorylin valmisteyhteenvedossa, sen tekemiseksi tarvitaan koiranomistajan suostumus, sillä kyseessä on off-label-suositus.