

Soveltuu seuraaville potilaille

- Potilas saa Vetoryl-hoitoa kerran tai kaksi kertaa päivässä.
- Potilaalla on lisämunuais- tai aivolisäkeperäinen hyperadrenokortisismi
- Kliinisesti hyvävointiset koirat (joilla on tai ei ole hyperadrenokortisismien oireita).
- Rauhalliset koirat.

Ei sovellu seuraaville potilaille

- Aggressiiviset koirat.
- Stressaantuneet koirat (joilla levottomuus on kestänyt kauemmin kuin vain noin tunnin).
- Kliinisesti huonovointiset koirat.



Mitä parempaa tiimityötä, sitä parempia tuloksia

Eläinlääkärin ja koiranomistajan yhteistyöllä
kohti parempia hoitotuloksia.

Eläinlääkärikäynti

- Varaa aika näytteenottoon ajankohtaan, jolloin koira yleensä saa Vetoryl-annoksensa.
- Jos kyseinen ajankohta on hankalasti järjestettävissä (esimerkiksi klo 6 aamulla), pyydä omistajaa antamaan Vetoryl sopivampana ajankohtana tutkimusta edeltävänä päivänä (esimerkiksi klo 9).
- Tarkista omistajalta, ettei koira ole saanut Vetoryl-annosta eikä aamun aikana ole tapahtunut mitään stressaavaa (esimerkiksi ettei koira ole oksentanut tai loukannut itseään).
- Hoidon tehoa arvioitaessa on ehdottoman välttämätöntä keskustella omistajan kanssa koiran kliinisestä vasteesta.

Näytteenotto


- Ota verikoe heti kliinisen tutkimisen jälkeen, ennen Vetoryl-annoksen antamista.
- 1–2 ml plasmaa tai seerumia.
- Näyte voidaan sentrifugoida ja säilyttää viikon ajan.
- Lähetä näyte ulkopuoliseen, laadunvarmistusohjelmaan (ESVE- tai SCE-ohjelma) kuuluvaan laboratorioon, joka mielellään käyttää Siemens IMMULITE® -menetelmää tai vastaavaa validoitua menetelmää.

Vetoryl® kapselit ja purutabletit koiralle. Vaikuttava aine: Trilostaani, 20 mg, 30 mg, 60 mg purutabletit; 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 60 mg och 120 mg kovat kapselit.
Rx. ATCvet-koodi: QH02CA01 **Kohde-eläinlaji:** Koira **Käyttöaiheet:** Aivolisäke- ja lisämunuaisperäisen lisämunuaiskuoren liikatoiminnan (Cushingin oireyhtymä) hoito koiralla **Vasta-aiheet:** Ei saa käyttää koirille, joilla on primaarinen maksasairaus ja/tai munuaisten vajaatoiminta. 5 mg, 10 mg ja 30 mg kapselit: Ei alle 3 kg koirille. 60 mg kapselit: Ei alle 10 kg koirille. 120 mg kapselit: Ei alle 20 kg koirille. **Tabletit:** Ei alle 3 kg koirille. **Erityisvaroitukset:** Lisämunuaiskuoren liikatoiminta täytyy diagnosoida oikein. Diagnoosi arvioidaan uudelleen, jos hoitoon ei ole ilmeistä vastetta. Annosta voidaan joutua suurentamaan. Eläinlääkärin täytyy huomioida, että lisämunuaiskuoren liikatoimintaa sairastavilla koirilla on kohonnut haimatulehduksen riski. Hoito trilostaanilla ei välttämättä vähennä tätä riskiä. **Eläimiä koskevat erityiset varoitukset:** Useimmat lisämunuaiskuoren liikatoimintatapaukset diagnosoidaan 10–15-v. koirilla, joilla on usein myös muita sairauksia. On erityisen tärkeää seuloa primaarista maksasairautta tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavat eläimet, koska valmistetta ei saa käyttää niille. Hoito edellyttää huolellista seurantaa. Erityisesti täytyy huomioida maksasäilytys, elektrolyytit, urea ja kreatiniini. Diabetes mellituksen ja lisämunuaiskuoren liikatoiminnan samanaikainen esiintyminen vaatii erityisseurantaa. Jos koira on aiemmin hoidettu mitotallaan, sen lisämunuaiskuoren toiminta on vähentynyt. Saatujen kokemusten mukaan mitotahoidon tulee lopettaa vähintään kuukautta ennen trilostaanhoidon aloittamista. Lisämunuaiskuoren toiminnan tiivistä seurantaa suositellaan, koska koirat saattavat olla alttiimpia trilostaanin vaikutuksille. Lääkettä pitää käyttää erittäin varovasti koirille, joilla on olemassa oleva anemia, koska lääke saattaa edelleen laskea hematokriittia ja hemoglobiinia. Koiraa täytyy seurata säännöllisin väliajoin primaarisen maksasairauden, munuaissairauden ja diabetes mellituksen varalta. Purutabletit ovat makutabletteja, vahingossa tapahtuvan nielemisen estämiseksi säilytä tabletit poissa eläinten ulottuvilta. **Erityiset varoitomenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:** Trilostaani voi heikentää testosteronituotantoa, ja sillä on anti-progesteronisia ominaisuuksia. Raskaana olevat ja raskautta suunnittelevat eivät saa käsitellä tätä lääkettä. Pese kädet käynten jälkeen. **Henkilöiden, jotka ovat yllherkkiä trilostaanille tai jollekin apuaineista, tulee välttää kosketusta lääkkeeseen.** Säilytä lääkkeet lämpösuojauksella alkuperäisessä pakkauksessa poissa lasten ulottuvilta. Jos tuotetta tulee vahingossa, ota heti yhteyttä lääkäriin ja näytä pakkauksen seloste. Vahingossa nieleminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten oksentelua ja ripulia. Kapselien sisältö voi ärsyttää ihon ja silmien sekä aiheuttaa yllherkkyitä. Kapselien ei saa jakaa eikä avata. **Haittavaikutukset:** Melko harvinaiset: Letargia, ruokahaluttomuus, oksentelu ja ripuli. Harvinaiset: Hypoadrenokortisismi (mukaan lukien Addisonin kriisi), hypersalivaatio, turvotus, ataksia, lihasten vapina, ihosairaudet, munuaisten vajaatoiminta ja niveleruma (johtuen endogeenisen kortikosteroiditasojen laskusta), heikkous. Hyvin harvinaiset: Lisämunuaiskuoren nekroosi, äkkikuolema. Tarkempia tietoja katso valmisteyhteenveto. Kortikosteroidien vieroitusoireyhtymä ja hypokortisolemia on erotettava lisämunuaiskuoren vajaatoiminnasta seerumin elektrolyytianalyysin avulla. **Tiineys ja laktatio:** Ei saa käyttää tiineyden tai laktation aikana eikä siitoseläimillä. **Yhteisvaikutukset:** Mahdollisia yhteisvaikutuksia muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole erityisesti tutkittu. Koska lisämunuaiskuoren liikatoiminta esiintyy usein iäkkäillä koirilla, monet niistä saavat samanaikaisesti muita lääkkeitä. Kliinisissä tutkimuksissa ei ole havaittu yhteisvaikutuksia. Hyperkalemian riski on otettava huomioon, jos trilostaania käytetään yhdessä kaliumia säästävien diureettien tai ACE-estäjien kanssa. Samanaikaisen käytön yhteydessä eläinlääkärin on tehtävä hyöty-riskiarvio, sillä kuolemia (mukaan lukien äkkikuolemia) on raportoitu koirilla, jotka ovat saaneet trilostaania yhdessä ACE-estäjän kanssa. **Annostus ja antotapa:** Valmiste annetaan suun kautta kerran päivässä ruoan kanssa. Hoidon aloitusannos on noin 2 mg/kg. Jos oireet eivät pysy riittävästi hallinnassa koko annosten välisen 24 tunnin ajan, harkitse päivittäisen kokonaisannoksen lisäämistä enintään 50 % ja annoksen jakamista samansuuruisiin aamu- ja iltä-annoksiin. Annoksen muuttaminen voi olla tarpeen, jos koiran hoito vaihdetaan Vetoryl-kapseleista Vetoryl-purutableteihin tai päinvastoin täydellistä vaihdettavuutta näiden kahden valmisteen välillä ei voida taata, koska jotkin koirat saattavat reagoida eri tavalla lääkemuodon vaihtoon. Lisätietoja tarkkailusta ja seurannasta saat ottamalla yhteyttä valmistajaan tai lukemalla lisätietoja www.dechra.fi -osoitteesta. **Myyntiluvan haltija:** Dechra Regulatory B.V. **Paikallinen edustaja:** Dechra Veterinary Products Oy. **Pakkaukset ja hinnat (tmh) 08.2025:** 5 mg 30 kaps 18,37€, 10 mg 30 kaps. 35,90€, 30 mg 30 kaps. 47,00€, 60 mg 30 kaps. 63,80€, 120 mg 30 kaps. 130,50€, 20 mg 30 tabl 44,90€, 30 mg 30 tabl. 48,90€, 60 mg 30 tabl. 65,80€ **Reseptilääke.** **Tekstin muuttamispäivä:** 2024-10-03 (purutabletit); 2025-01-29 (kapselit). **Yliä oleva teksti on lyhennetty yhteenveto valmisteyhteenvedosta. Lisätietoja:** Pharmacia Fennica Oy tai www.dechra.fi.



Cushingin oireyhtymän seuranta

Kehitetty yhteistyössä seuraavien asiantuntijoiden kanssa: Ian Ramsey BVSc, PhD, DSAM, Dipl. ECVIM-CA, FHEA, MRCVS, Federico Fracassi DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA, Nadja Sieber-Ruckstuhl PhD, Dr. med. vet, Dipl. ACVIM, Dipl. ECVIM-CA



Kaavion/hoitovasteen tulkinta

¹ Polyurian/polydipsian, polyfagian, läähätyksen ja letargian pitää loppua tai parantua kuukauden kuluessa. Alopesian ja vatsan pingottuneisuuden parantuminen/normalisoituminen vie yleensä 3–6 kuukautta.

² Mieti potilaan aiempia sairauksia ja harkitse Pre-Vetoryl-ACTH-stimulaatiota. Ota tarvittaessa yhteyttä Dechran tekniseen tukeen.

³ Jos oireet eivät pysy asianmukaisesti hallinnassa vuorokauden ympäri, harkitse vuorokausiannoksen suurentamista noin 50 % ja sen jakamista kahteen annokseen.

⁴ Käytä kapselin tai purutablettien yhdistelmää suurentaaksesi tai pienentääksesi vuorokausiannosta.

⁵ Jatkuva deksametasoni-infuusio tai vaihtoehtoisesti hydrokortisoni hypokortisolismin hoitoon, nesteytys laskimoon elimistön kuivumistilan ja hyperkalemian korjaamiseksi.

*Nämä luvut perustuvat Siemens IMMULITE 1000/2000 -laitteiston käyttöön. Muilla analyysilaitteistoilla voi olla muita viitearvoja, hoitavan eläinlääkärin pitää epäselvissä tilanteissa konsultoida laboratoriotaan.

Dechra Veterinary Products Oy technical.nordic@dechra.com
www.dechra.fi ©Dechra Veterinary Products A/S Syyskuu 2025